

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

DLP 11-4-88034049

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès, et de la Piège  
(rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et le G.V.A.)

N° 5 du 6 Avril 1988


## POIS PROTEAGINEUX \*\*\*\*\*

### Anthraxnose - Botrytis

Compte tenu des conditions actuelles, le risque encouru par les pois est important pour ces deux maladies.


Nous vous conseillons de traiter vos cultures dès que possible à l'aide d'une des solutions suivantes :

- BRAVO Plus ou CERECLAIR..... 2 L/Ha
- B.T.F..... 3,5 L/Ha
- PELTAR Flo..... 5 L/Ha



ASCOCHYTA PINODES

(Anthraxnose)



ASCOCHYTA PISI

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



### Pucerons.

Si vous constatez la présence de pucerons dans vos cultures, et en raison du risque éventuel d'autres ravageurs possible sur pois, ajoutez au fongicide que vous aurez retenu :

- TORAK E.....1,5 L/Ha

### **CEREALES**

\*\*\*\*\*


#### Blé dur :

Observez vos champs de MONDUR et PRIMADUR.

La Rouille Brune étant pratiquement présente en toutes situations si vous l'observez sur des plantes ayant atteint le stade 2 Noeuds, traitez sans tarder à l'aide d'une des spécialités suivantes :

- TILT C..... 1 L/Ha  
- IMPACT R.M..... 1 L/Ha  
- PUNCH C..... 0,8 L/Ha

Il est inutile de traiter les CAPDUR si une intervention éventuelle s'avèrera nécessaire sur cette variété, ce sera plus tard.



2eme noeud

Stade 7

### **COLZA**

\*\*\*\*\*

Pour les cultures tardives, rappel du risque Mèligethe, (voir bulletin n° 4 du 23 Mars dernier).

Les risques possibles, de dégâts de ce ravageur disparaissent avec l'apparition des premières fleurs, il est donc inutile de traiter des cultures même partiellement fleuries.

(Tirage du 6 Avril 1988 - 1600 exemplaires)

(c) Bulletin technique des avertissements agricoles - Montpellier 1988 - S.P.V.